

ADENOPATIA SUPRACLAVICULAR TRAS VACUNA BCG

MA. Ibañez Estevez*, E. Onís Gonzalez, I. Blanco Salazar, F.J. Martínez Aldecoa.
Centro de Salud San Adrián (Bilbao).
C/ Islas Canarias 37-4º. 48015 Bilbao. Tfno 659728594.
mibanezestevez@gmail.com.

Antecedentes: Calmette y Guérin originaron la vacuna BCG en 1921 a partir de un extracto de *M. bovis*. Desde entonces ha sido ampliamente utilizada a nivel mundial para la profilaxis de la tuberculosis (TBC) administrándose vía intradérmica en la cara externa del brazo (inserción distal del músculo deltoides). Actualmente la OMS recomienda su uso en zonas de elevada prevalencia de TBC. En nuestro país la vacunación sistemática con BCG en los recién nacidos se abandonó en 1980 (1974 en Cataluña), y se mantiene sólo en el País Vasco.

Las reacciones adversas por BCG son generalmente locales y benignas, se dan en el 1- 2% de los niños vacunados y se atribuyen a una inyección profunda o a una dosis excesiva. La úlcera en el punto de inoculación es la reacción adversa más frecuente de la vacunación con BCG. La linfadenitis regional es un efecto adverso infrecuente (<1% de los niños vacunados). Habitualmente se trata de una adenopatía axilar única, que en ocasiones da lugar a supuración y fistulización secundaria, resolviéndose de manera espontánea en varias semanas. La linfadenitis supraclavicular aislada, o asociada a otras localizaciones, ha sido descrita en la literatura como un efecto adverso raro (<0,5%).

Métodos: Se recogen los casos de adenopatía supraclavicular por vacuna BCG acontecidos en un centro de salud de localización urbana en el transcurso de un año.

Resultados: Presentamos 5 casos de adenopatía supraclavicular en lactantes menores de 1 año a consecuencia de la vacunación por BCG. Dos de ellos se acompañaron de fistulización de la adenopatía y 3 casos asociaron adenopatías en otras localizaciones. Todos ellos presentaron una evolución benigna sin necesidad de tratamiento.

Conclusiones: Las adenopatías supraclaviculares tras vacunación BCG son un efecto adverso poco frecuente que plantea un diagnóstico diferencial en el que se incluyen procesos oncológicos. Presentan una evolución benigna y se resuelven de manera espontánea sin necesidad de medidas diagnósticas ni terapéuticas adicionales.

SOLICITADO..... POSTER