



# No Hacer

## Grupo de Trabajo de Infección Fúngica Invasiva

**No Interpretar**

Como infección el aislamiento de *Candida* spp. en muestras respiratorias

**No Dejar de hacer** Niveles de voriconazol e itraconazol en niños.

**No Suspender**

Tratamiento antifúngico antes de los 14 días tras hemocultivo negativo en candidemias.

**No Realizar**

Seguimiento rutinario mediante biomarcadores en los pacientes que reciben profilaxis antifúngica.

**No Interpretar**

Nunca como contaminante el aislamiento de *Candida* en un hemocultivo.



El aislamiento de *Candida* spp. en muestras obtenidas del tracto respiratorio (esputo, aspirado traqueal, lavado o aspirado broncoalveolar) refleja colonización y no infección.

Numerosos estudios muestran un bajo valor predictivo de enfermedad invasiva de los aislamientos de *Candida* spp. en muestras respiratorias, puesto que no se corresponden con hallazgos histopatológicos.

Las neumonías o abscesos pulmonares producidos por *Cándida* son excepcionales y se limitan a pacientes gravemente inmunodeprimidos, en los que suelen producirse por vía hematógena tras una candidemia, a menudo con endocarditis derecha.

No

interpretar

como infección el  
aislamiento de *Candida*  
spp. en muestras  
respiratorias.

#### Bibliografía

1. Pappas PG, Kauffman CA, Andes et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis*. 2016 Feb 15; 62(4):409-17.
2. Pasqualotto AC. *Candida* and the paediatric lung. *Paediatr Respir Rev*. 2009 Dec; 10(4):186-91.
3. Meersseman W, Lagrou K, Spriet et al. Significance of the isolation of *Candida* species from airway samples in critically ill patients: a prospective, autopsy study. *Intensive Care Med*. 2009 Sep; 35(9):1526-31.

Dado que el aislamiento de *Candida* spp. en muestras respiratorias no se correlaciona con la presencia de neumonía, además de lo poco frecuente de esta entidad, no debe iniciarse un tratamiento antifúngico basado únicamente en el resultado del cultivo.



## Grupo de Trabajo de Infección Fúngica Invasiva

La diferente farmacocinética de los azoles en el niño respecto al adulto, con gran variabilidad de la misma, impide predecir los niveles plasmáticos con certeza

En la práctica asistencial rutinaria se deben hacer niveles plasmáticos de itraconazol y voriconazol por la gran variabilidad farmacocinética entre pacientes en la edad pediátrica, lo que hace que los niveles sean impredecibles, aún con dosis iniciales altas, asociándose a falta de eficacia en profilaxis y tratamiento, o toxicidad por su estrecho rango terapéutico.

En niños se requieren dosis más altas relativas para conseguir niveles terapéuticos, si bien los niveles plasmáticos son muy variables

Por ello, todas las guías terapéuticas en la infancia recomiendan determinación de niveles plasmáticos a los pocos días del inicio del tratamiento para ajustar en valle con diana terapéutica de 1-4 mg/L para itraconazol y 2-5 mg/L para voriconazol.

# No

## dejar de hacer

## niveles de voriconazol e itraconazol en niños.

### Bibliografía

1. Karlsson MO, Lutsar I, Milligan PA. Population pharmacokinetic analysis of voriconazole plasma concentration data from pediatric studies. *Antimicrob Agents Chemother* 2009; 53: 935-44.
2. Soler-Palacín P, Frick MA, Martín-Nalda A, et al. Voriconazole drug monitoring in the management of invasive fungal infection in immunocompromised children: a prospective study. *J Antimicrob Chemother* 2012;67:700-6.
3. Ullmann AJ, Aguado JM, Arikan-Akdagli S, et al. Diagnosis and management of Aspergillus diseases: executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM-ERS guideline. *Clin Microbiol Infect.* 2018;24:e1-38.

Debido a la alta variabilidad farmacocinética de los azoles en el paciente pediátrico, se recomienda la medición de niveles plasmáticos de voriconazol e itraconazol tanto en pautas de tratamiento como de profilaxis.



## Grupo de Trabajo de Infección Fúngica Invasiva.

La infección fúngica por *Candida* spp. es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en pacientes de riesgo, de ahí la importancia de establecer un tratamiento antifúngico precoz y de duración adecuada.

Según las guías clínicas publicadas, en aquellos pacientes con aislamiento de *Candida* spp. en el hemocultivo, independientemente de la cifra de neutrófilos, se debe mantener el tratamiento antifúngico hasta que se resuelva la clínica y al menos hasta transcurridos 14 días tras el primer hemocultivo negativo, siempre que no se objetive complicación metastásica a otros niveles en el estudio de extensión.

Para establecer una duración adecuada en pacientes con candidemia, es de utilidad la realización de hemocultivos diarios o en días alternos hasta recibir el primer hemocultivo negativo.

Esta recomendación está basada en los resultados de estudios prospectivos y aleatorizados, en los que se establece dicha duración en la metodología, no objetivándose complicaciones ni recaídas en los resultado.

Como excepción, en recién nacidos, sobre todo los pretérminos de muy bajo peso se recomienda tener al menos dos hemocultivos seguidos negativos para tener en cuenta esta recomendación y en ellos, si la candidemia ha sido persistente (>72 horas tras inicio de antifúngico efectivo, se debe valorar una duración más larga, 21 días.

# No

## suspender

### tratamiento antifúngico antes de los 14 días tras hemocultivo negativo en candidemias.

#### Bibliografía

1. Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases society of America. Clin Infect Dis. 2016; 62 (4): e1- e50.
2. Tissot F, Agrawal S, Pagano L, et al. ECIL- 6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica. 2017; 102 (3): 433- 444.
3. Izquierdo G, Santolaya ME. Invasive candidiasis in newborns: diagnosis, treatment and prophylaxis. Rev Chilena Infectol. 2014; 31 (1):73-83.

En aquellos pacientes con candidemia, debemos mantener el tratamiento antifúngico hasta al menos 14 días tras el primer hemocultivo negativo, siempre que no haya complicaciones metastásicas y se hayan resuelto los signos clínicos y microbiológicos relativos a la candidemia.



## Grupo de Trabajo de Infección Fúngica Invasiva.

En los pacientes que reciben profilaxis antifúngica no está indicado el seguimiento, para hacer terapia anticipada, mediante biomarcadores de infección fúngica por el hongo frente al que se ha establecido la profilaxis. Esto se debe a varias razones:

- La primera es que, en estas circunstancias, el biomarcador será negativo la gran mayoría de las veces, lo que supone costos innecesarios.
- La segunda es que, si el antifúngico empleado en la profilaxis es efectivo frente un hongo o grupo de hongos, la infección fúngica de brecha por estos hongos es muy baja (alrededor del 2%).
- Por último, la tercera y quizás más importante de las razones, es que en estas circunstancias el valor predictivo positivo de la prueba es muy bajo (alrededor del 10%), lo que significa que la gran mayoría de las determinaciones serán falsos positivos, lo que, a su vez, puede conducir a realizar pruebas diagnósticas innecesarias. Sin embargo, si en estas mismas circunstancias el biomarcador se determina por sospecha clínica de infección fúngica, el valor predictivo positivo de la prueba se incrementa hasta el 90%.

Esto se demostró inicialmente en adultos con profilaxis primaria con posaconazol a los que se les hacía seguimiento con determinaciones seriadas de galactomanano en suero para detectar la infección por *Aspergillus* spp. Después se ha comprobado un fenómeno similar con otros tipos de profilaxis.

Como es habitual, casi todos los estudios que han investigado sobre este tema proceden de adultos.

# No

## realizar

### seguimiento rutinario mediante biomarcadores en los pacientes que reciben profilaxis antifúngica.

#### Bibliografía

1. Duarte RF, Sánchez-Ortega I, Cuesta I, et al. Serum galactomannan-based early detection of invasive aspergillosis in hematology patients receiving effective antimold prophylaxis. *Clin Infect Dis.* 2014; 59 (12):1696-702.
2. Lehrnbecher T, Robinson PD, Fisher BT, et al. Galactomannan,  $\beta$ -D-Glucan, and Polymerase Chain Reaction-Based Assays for the Diagnosis of Invasive Fungal Disease in Pediatric Cancer and Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clin Infect Dis.* 2016;63(10):1340-8.
3. Lehrnbecher T, Robinson P, Fisher et al. Guideline for the Management of Fever and Neutropenia in Children With Cancer and Hematopoietic Stem-Cell Transplantation Recipients: 2017 Update. *J Clin Oncol.* 2018;35(18):2082-94.

En pacientes con profilaxis antifúngica está indicado hacer biomarcadores fúngicos solo en caso de sospecha clínica y no de forma rutinaria como parte de la terapia anticipada, ya que esta última práctica puede conducir a realizar pruebas diagnósticas y, quizás, tratamientos innecesarios.



## Grupo de Trabajo de Infección Fúngica Invasiva.

La infección fúngica por *Candida* spp. es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en pacientes de riesgo, de ahí la importancia de establecer un tratamiento antifúngico precoz y de duración adecuada.

Según las guías clínicas publicadas, en aquellos pacientes con aislamiento de *Candida* spp. en el hemocultivo, independientemente de la cifra de neutrófilos, se debe mantener el tratamiento antifúngico hasta que se resuelva la clínica y al menos hasta transcurridos 14 días tras el primer hemocultivo negativo, siempre que no se objetive complicación metastásica a otros niveles en el estudio de extensión.

Para establecer una duración adecuada en pacientes con candidemia, es de utilidad la realización de hemocultivos diarios o en días alternos hasta recibir el primer hemocultivo negativo.

Esta recomendación está basada en los resultados de estudios prospectivos y aleatorizados, en los que se establece dicha duración en la metodología, no objetivándose complicaciones ni recaídas en los resultado.

Como excepción, en recién nacidos, sobre todo los pretérminos de muy bajo peso se recomienda tener al menos dos hemocultivos seguidos negativos para tener en cuenta esta recomendación y en ellos, si la candidemia ha sido persistente (>72 horas tras inicio de antifúngico efectivo, se debe valorar una duración más larga, 21 días.

# No

## suspender

### tratamiento antifúngico antes de los 14 días tras hemocultivo negativo en candidemias.

#### Bibliografía

1. Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases society of America. Clin Infect Dis. 2016; 62 (4): e1- e50.
2. Tissot F, Agrawal S, Pagano L, et al. ECIL- 6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica. 2017; 102 (3): 433- 444.
3. Izquierdo G, Santolaya ME. Invasive candidiasis in newborns: diagnosis, treatment and prophylaxis. Rev Chilena Infectol. 2014; 31 (1):73-83.

En aquellos pacientes con candidemia, debemos mantener el tratamiento antifúngico hasta al menos 14 días tras el primer hemocultivo negativo, siempre que no haya complicaciones metastásicas y se hayan resuelto los signos clínicos y microbiológicos relativos a la candidemia.